



MSE-Online

2025-25 (28 Seiten)

Eingang: 28.11.2025

Online: 01.12.2025

PESCHEL, R. & PETZOLD, W. (2025):

**Zur Kenntnis der in den Jahren 2002 bis 2024 im Crimmitschauer Wald
(Chemnitz/Sachsen) gefundenen Käferarten (Coleoptera) nebst Vermerk zu
Neufunden für die Käferfauna von Chemnitz**



Impressum

Herausgeber

Entomofaunistische Gesellschaft e.V., Landesverband Sachsen [http:// www.efgsachsen.de](http://www.efgsachsen.de)

Redaktion

Rolf Reinhardt, Burgstädter Str. 80a, 09648 Mittweida – Reinhardt-Mittw@t-online.de

Jörg Gebert, Karl-Liebnecht-Str. 73, 01109 Dresden – joerg.gebert@gmx.de

Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Klausnitzer, PF 202731, 01193 Dresden – klausnitzer.col@t-online.de

<https://www.efgsachsen.de/mse-online/>

Online-Version der „Mitteilungen Sächsischer Entomologen“ (MSE) © Alle Rechte vorbehalten!

Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren selbst verantwortlich

In eigener Sache

Liebe Leser der online-MSE, wir können unsere Zeitschrift nur aufrechterhalten, wenn wir möglichst viele Abonnenten haben. Überlegen Sie bitte, ob Sie dazu zählen wollen und damit einen Beitrag zur Verbreitung der Kenntnisse über Sachsens Insektenwelt leisten. Natürlich können Sie auch spenden, da wir ein gemeinnütziger Verein sind und die Spende steuerabzugsfähig beim Finanzamt ist.

IBAN: DE53 8509 0000 4845 711009 Volksbank Dresden-Bautzen e.G.; BIC: GENODEF1DRS

Zur Kenntnis der in den Jahren 2002 bis 2024 im Crimmitschauer Wald (Chemnitz/Sachsen) gefundenen Käferarten (Coleoptera) nebst Vermerk zu Neufunden für die Käferfauna von Chemnitz


RÜDIGER PESCHEL, Chemnitz & WERNER PETZOLD, Flöha

Eingang: 28.11.2025


Schlüsselwörter/Key words: Sachsen, Naturraum: Erzgebirgsbecken (21 EGB), Stadt Chemnitz, Crimmitschauer Wald; Coleoptera; Fauna, Freilanduntersuchung

Einleitung

Der Crimmitschauer Wald (50° 50' 12" N, 12° 53' 5" O) (Karte 1 und 2) am Stadtrand von Chemnitz gelegen zwischen Borna und Altendorf, trägt vermutlich seit dem 14. Jahrhundert den Namen des Abtes ULRICH von CRIMMITSCHAU aus dem Chemnitzer Benediktinerkloster. Dem Kloster diente der Wald hauptsächlich zur Jagd. Nach der Auflösung des Klosters gehörten nur 21 ha des Waldes zur Chemnitzer Stadtflur. Erst mit der Eingemeindung Altendorfs am 1. Juli 1900 folgte der größere, restliche Teil. An den Crimmitschauer Wald grenzen das ehemalige Max-Planck-Stadion, das Küchwaldkrankenhaus und der Botanische Garten an. Der Chemnitzer Stadtteil Altendorf liegt nordwestlich des Stadtzentrums. Angrenzend an Altendorf sind die Stadtteile Borna-Heinersdorf, Schloßchemnitz, Kaßberg, Schönau und Rottluff. Der heutige Stadtteil Altendorf nimmt im Wesentlichen die Fläche der früheren Gemeinde Altendorf ein. Die Stadtteil- und Gemarkungsgrenzen sind jedoch überwiegend nicht identisch. Der größte Teil der 4,41 km² Waldfläche gehört zur Gemarkung Altendorf.



Karte 1 = Chemnitz, aus: <https://www.urlaubsziele.com/staedte/473/>



Karte 2 aus: https://www.chemnitz.de/fileadmin/chemnitz/media/unsere-stadt/gruenes-chemnitz/kommunalwald_entwicklung_crimmitschauer_wald.pdf

Der Crimmitschauer Wald, welcher auch der Naherholung dient, ist als Mischwaldgebiet geprägt von *Betula pendula*, *Quercus robur*, *Quercus rubra*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*, *Carpinus betulus*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Picea abies*, *Larix decidua*, *Pseudotsuga menziesii*, *Pinus strobus*, *Fagus sylvatica* u. a. m.

Methodik

Die vorläufige Artenliste basiert auf dem Sammlungsmaterial der Autoren, aus einem unveröffentlichten Gutachten von REIKE (2024) und vorliegendem historischen Material aus dem Zeitraum 1941- 1946 (leg. ZABEL, coll. PESCHEL [Chemnitz] & coll. PETZOLD [Flöha]). Die Arterfassung wurde vom Grünflächenamt der Stadt Chemnitz, Sachgebiet Forst, unterstützt. Neben Handaufsammlungen erfolgten bevorzugt Siebungen an und im Totholz. Das Klopfen von Baumpilzen, Totholzstrukturen und der Vegetation, das Keschern, Schwemmen und Treten der Ufer (Bach, Teich) wurden ebenso angewendet. Wenn sich Gelegenheiten boten, erfolgte das Absuchen loser Rinde absterbender und toter Bäume. Am 26.03.2012 bot sich die Möglichkeit einer Siebung an einer Wildfütterstelle, in deren Ergebnis bereits 37 Arten nachgewiesen und vorgestellt wurden (PESCHEL 2021). Die Artenliste beinhaltet 18% des vorläufig bekannten Arteninventars an Käfern (2019 Arten) in der Stadt Chemnitz. Im benannten Erfassungszeitraum gelangen in diesem Waldgebiet 20 Neufunde für die Stadt Chemnitz (darunter ein Neufund für Sachsen). Es erfolgt eine Zusammenfassung der bislang bekannt gewordenen Arten.

Dank

Besonderer Dank gilt dem Grünflächenamt der Stadt Chemnitz, Sachgebiet Forst, und Herrn H.-P.-REIKE (Chemnitz) für ihre Hilfe und Unterstützung bei unserer Arbeit. Sie ermöglichten die Nutzung der Daten aus dem unveröffentlichten Gutachten und deren Übernahme und Einbindung in das Gesamtprojekt einer Käferfauna von Chemnitz. Ebenso möchten wir uns für die sachdienlichen Hinweise zum Manuskript bedanken. An dieser Stelle sei auch den nachstehend genannten Kolleginnen und Kollegen unser Dank übermittelt, welche uns bei der Determinationsarbeit Hilfe und Unterstützung gewährten: Frau H. WENDT (†) (Berlin), V. STRUTZBERG (Dissen-Striesow), W. APFEL (Eisenach), K. BURGARTH (Stelle), J. ESSER (Berlin), R. FELIX (Berkel Enscht, Niederlande), H. FUCHS (München), J. GEBERT (Dresden), I. GÜNTHER (Dresden), F. HEBAUER (Plattling), U. HEINIG (Berlin), H. HERMANN (Schlüchtern), W. HOFFMANN (Hoyerswerda), E. HOLZER (Anger, Österreich), B. KLAUSNITZER (Dresden), F. KÖHLER (Bornheim), E. KONZELMANN (Ludwigsburg), A. KOPETZ (Eischleben), K. LIEBENOW (Brandenburg), J. LORENZ (Löthain), J. REIBNITZ (Tamm), E. RÖßNER (Schwerin), W. RÜCKER (Neuwied), J. RUZICKA (Prag, Tschechien), M. SCHÜLKE (Berlin), M. SIEBER (Großschönau), M. SÖRENSSON (Lund, Schweden), D. SPITZENBERG (Hecklingen), P. SPRICK (Hannover), J. VOGEL (Görlitz), A. WEIGEL (Wernburg).

Artenliste

Die Rang- und Reihenfolge der Familien und Arten folgt der Grundlage der aktualisierten Gesamtübersicht bei KLAUSNITZER et al. (2018). Die Artenliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Legende: * – faunistisch bemerkenswerte Art; n – Stückzahl, S&B (2004) – SCHMIDL & BUßLER (2004) ökologische Gilden und Indikatorarten der xylobionten Käfer, IndxyKD – Indikatorarten und waldökologisch besonders relevante Arten (SCHMIDL & BUßLER 2004), LÖR – Landschaftsökologisch relevante Art (SCHMIDL & BUßLER 2004), UrR – Urwaldreliktart (SCHMIDL & BUßLER 2004, LORENZ 2010), xy – xylobiont, xyA – Altholzbesiedler, xyF – Frischholzbesiedler, xyM – Mulmhöhlenbesiedler, xyH – Holzpilzbesiedler, xyS – Sonderbiologie, RLD – Rote Liste Deutschland, 0 – ausgestorben oder verschollen, 1 – vom Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet, R – extrem selten, D – Datenlage defizitär, V – Vorwarnliste, G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes (1995 Kategorien 3* und 4), CRW – Crimmitschauer Wald, BaU – Buche, BU – Buche, LA – Laub, TH – Totholz, uSt – unter Stein, WK – Weymoutskiefer, WS – Waldstreu, cRC – coll. REIKE (Chemnitz), cPC – coll. PESCHEL (Chemnitz), cPF – coll. PETZOLD (Flöha), cKL – coll. KONZELMANN (Ludwigsburg), CLB – coll. BERGER (Chemnitz), RE (2024), PE (2021) – siehe Literatur REIKE (2024), PESCHEL (2021)

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
	Carabidae				
1	<i>Leistus ferrugineus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.05.2008	uSt, Südrandlage	cPC
2	<i>Nebria brevicollis</i> (FABRICIUS, 1792)	4	19.05.2008	uSt, Südrandlage	cPC
3	<i>Notiophilus biguttatus</i> (FABRICIUS, 1779)	2 1	18.06.2005 06.09.2009	WS, gesiebt TH, BU, gesiebt	cPC cPC
4	<i>Loricera pilicornis</i> (FABRICIUS, 1775)	1 1	19.04.2006 26.03.2012	LA, gesiebt (PE 2021)	cPC cPC
5	<i>Bembidion lampros</i> (HERBST, 1784)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
6	<i>Bembidion properans</i> (STEPHENS, 1828)	1	11.06.2005		cPC
7	<i>Bembidion deletum</i> AUDINET-SERVILLE, 1821	1	26.06.2002	BaU, gespült	cPC
8	<i>Bembidion tetracolum</i> SAY, 1823	1	26.06.2002	BaU, gespült	cPC
9	<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (LINNAEUS, 1760)	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
10	<i>Bembidion mannerheimii</i> SAHLBERG, 1827	1	06.03.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
11	<i>Asaphidion flavipes</i> (LINNAEUS, 1760)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
12	<i>Asaphidion curtum</i> (HEYDEN, 1870)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
13	<i>Anisodactylus binotatus</i> (FABRICIUS, 1787)	2	19.05.2008	uSt, Südrandlage	cPC
14	<i>Harpalus affinis</i> (SCHRANK, 1781)	1	11.06.2005	uSt, Südrandlage	cPC
15	<i>Poecilus cupreus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.05.2008	uSt, Südrandlage	cPC
16	<i>Pterostichus vernalis</i> (PANZER, 1796)	1	23.06.2010		cPC
17	<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (FABRICIUS, 1787)	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
18	<i>Pterostichus niger</i> (SCHALLER, 1783)	1	19.05.2008	uSt, Südrandlage	cPC
19	<i>Agonum viduum</i> (PANZER, 1796)	3	08.08.2004	am Ufer des Waldteiches	cPC
20	<i>Limodromus assimilis</i> (PAYKULL, 1790)	3	26.06.2002	BaU, gespült	cPC
21	<i>Amara brunnea</i> (GYLLENHAL, 1810)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
22	<i>Dromius quadrimaculatus</i> (LINNAEUS, 1758)	3 1 8	28.02.2010 16.03.2007 10.03.2009	jeweils TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC cPC
23	<i>Calodromius spilotus</i> (ILLIGER, 1798)	3 4	28.02.2010 10.03.2009	jeweils TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
24	<i>Philorhizus notatus</i> (STEPHENS, 1827)	1	03.07.2006	TH, gesiebt	cPC
Haliplidae					
25	<i>Halipus ruficollis</i> (DEGEER, 1774)	1	08.08.2004	Waldteich	cPC
26	<i>Halipus heydeni</i> WEHNCKE, 1875	3	08.08.2004	Waldteich	cPC
27	<i>Halipus immaculatus</i> GERHARDT, 1877	1	08.08.2004	Waldteich	cPC
Dytiscidae					
28	<i>Agabus bipustulatus</i> (LINNAEUS, 1767)	1	08.08.2004	Waldteich	cPC
29	<i>Ilybius fuliginosus</i> (FABRICIUS, 1792)	7 1	08.08.2004 11.06.2005	Waldteich Waldteich	cPC cPC
Hydrophilidae					
30	<i>Cercyon obsoletus</i> (GYLLENHAL, 1808)	3	23.06.2010	an Pferdekot	cPC
31	<i>Cryptopleurum minutum</i> (FABRICIUS, 1775)	1	23.06.2010		cPC
32	<i>Anacaena lutescens</i> (STEPHENS, 1829)	2 1	08.08.2004 28.02.2010	Waldteich TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
Histeridae					
33	<i>Plegaderus vulneratus</i> (PANZER, 1797) xyF, LÖR	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
*34	<i>Abraeus granulum</i> ERICHSON, 1839 xyA, LÖR	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
35	<i>Paromalus flavicornis</i> (HERBST, 1792) xyA, LÖR	1 1 1 1 1 1 10 1 1	26.06.2002 16.03.2006 19.04.2006 19.04.2006 16.03.2007 26.04.2008 26.03.2012 26.05.2024 21.07.2024	TH, gesiebt TH, gesiebt TH, BU, gesiebt LA, gesiebt TH, gesiebt TH, BU, gesiebt TH, BU, gesiebt CRW CRW	cPC cPC cPC cPC cPC cPC cPC cRC cRC
36	<i>Paromalus parallelepipedus</i> (HERBST, 1791) xyF, LÖR	16 2 2	16.03.2007 26.03.2012 13.06.2024	TH, WK, Rinde gesiebt (PE 2021) CRW	cPC cPC cRC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
37	<i>Hister unicolor</i> LINNAEUS, 1758	1	23.06.2010	Grashaufen gesiebt	cPF
	Silphidae				
38	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (LINNAEUS, 1758)	2	18.06.2005	CRW	cPC
39	<i>Silpha tristis</i> ILLIGER, 1798	1	18.06.2005	CRW	cPC
	Leiodidae				
40	<i>Nargus wilkini</i> (SPENCE, 1813)	1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
*41	<i>Amphicyllis globiformis</i> (SAHLBERG, 1833)	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
42	<i>Agathidium rotundatum</i> (GYLLENHAL, 1827)	1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
43	<i>Agathidium seminulum</i> (LINNAEUS, 1758)	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
	Ptiliidae				
44	<i>Pteryx suturalis</i> (HEER, 1841) xyA	1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
	Staphylinidae				
45	<i>Scydmorephes minutus</i> (CHAUDOIR, 1845) xyA, RLD G	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
46	<i>Microscydus minimus</i> (CHAUDOIR, 1845) xyA	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
47	<i>Scydmaenus rufus</i> MÜLLER & KUNZE, 1822	1	26.03.2012	TH, BU, gesiebt	cPC
48	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> OLIVIER, 1790 xyH	1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
49	<i>Scaphisoma agaricinum</i> (LINNAEUS, 1758) xyH	1 1 1	26.06.2002 06.09.2009 06.08.2024	 TH, BU, gesiebt RE (2024)	cPC cPC cRC
50	<i>Phloeocharis subtilissima</i> MANNERHEIM, 1830 xyA	3 1 5 1 4 1 2 1	19.04.2006 16.03.1007 10.03.2009 26.03.2012 26.05.2024 21.07.2024 06.08.2024 26.03.2012	TH, BU, gesiebt TH, BU, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt TH, BU, gesiebt RE (2024) RE (2024) RE (2024) PE (2021)	cPC cPC cPC cPC cPC cRC cRC cRC
51	<i>Proteinus atomarius</i> ERICHSON, 1840	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
52	<i>Eusphalerum signatum</i> (MÄRKEL, 1857)	1	19.05.2008		cPC
53	<i>Omalium rivulare</i> (PAYKULL, 1789)	5 1 1 1	11.06.2005 19.06.2008 26.03.2012 26.05.2024	WS, gesiebt Waldrand gesiebt PE (2021) RE (2024)	cPC cPC cPC cRC
54	<i>Omalium caesum</i> GRAVENHORST, 1806	1	15.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
55	<i>Phloeonomus pusillus</i> (GRAVENHORST, 1806) xyF	1 6	19.04.2006 10.03.2009	TH, BU, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
56	<i>Xylostiba monilicornis</i> (GYLLENHAL, 1810) xyF	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
57	<i>Phloeostiba lapponica</i> (ZETTERSTEDT, 1838) xyF	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
58	<i>Anthobium atrocephalum</i> (GYLLENHAL, 1827)	1 1	16.03.2007 26.03.2012	TH, BU, gesiebt PE (2021)	cPC cPC
59	<i>Platystethus alutaceus</i> THOMSON, 1861	1	08.08.2004		cPC
60	<i>Stenus fossulatus</i> ERICHSON, 1840	1	26.06.2002	BaU, gespült	cPC
61	<i>Stenus clavicornis</i> (SCOPOLI, 1763)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
62	<i>Stenus bimaculatus</i> GYLLENHAL, 1810	1	26.06.2002	BaU, gespült	cPC
		1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
63	<i>Stenus humilis</i> ERICHSON, 1839	1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
64	<i>Stenus flavipes</i> STEPHENS, 1833	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
65	<i>Lathrobium longulum</i> GRAVENHORST, 1802	4	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
66	<i>Nudobius lentus</i> (GRAVENHORST, 1806) xyF	5	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
		1	28.02.2010	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
		1	26.05.2024	RE (2024)	cRC
67	<i>Gyrophypnus punctulatus</i> (PAYKULL, 1789)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
68	<i>Gyrophypnus angustatus</i> STEPHENS, 1833	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
69	<i>Xantholinus tricolor</i> (FABRICIUS, 1787)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
70	<i>Xantholinus laevigatus</i> JACOBSEN, 1849	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
71	<i>Xantholinus linearis</i> (OLIVIER, 1795)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
72	<i>Xantholinus longiventris</i> HEER, 1839	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
73	<i>Atrecus affinis</i> (PAYKULL, 1789) xyA	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
74	<i>Othius subuliformis</i> STEPHENS, 1833	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
75	<i>Philonthus albipes</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
76	<i>Philonthus decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
77	<i>Philonthus carbonarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	08.08.2004	Waldteichufer	cPC
78	<i>Philonthus varians</i> (PAYKULL, 1789)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
79	<i>Philonthus splendens</i> (FABRICIUS, 1793)	1	23.06.2010	Pferdekot	cPC
80	<i>Bisnius fimetarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	5	08.08.2004	Waldteichufer	cPC
		1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
81	<i>Gabrius splendidulus</i> (GRAVENHORST, 1802) xyA	1	26.06.2002	BaU, gespült	cPC
		2	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
		1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
		1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
82	<i>Gabrius breviventer</i> (SPERK, 1835) syn. <i>G. coxalus</i> HOCHHUT, 1871	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
83	<i>Heterothops dissimilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	2	26.03.2012	PE (2021)	cPC
84	<i>Quedius cruentus</i> (OLIVIER, 1795)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
		1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
		2	13.06.2024	RE (2024)	cRC
		1	21.07.2024	RE (2024)	cRC
85	<i>Quedius maurus</i> (SAHLBERG, 1830) xyA	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
		2	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
86	<i>Quedius fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	11.06.2005	WS, gesiebt	cPC
87	<i>Quedius maurorufus</i> (GRAVENHORST, 1806)	1	26.06.2002		cPC
88	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAVENHORST, 1806)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
		1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
89	<i>Sepedophilus testaceus</i> (FABRICIUS, 1793) xyA	1	16.03.2007	Totholz, gesiebt	cPC
		1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
		1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
90	<i>Sepedophilus marshami</i> (STEPHENS, 1832)	1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
91	<i>Tachyporus nitidulus</i> (FABRICIUS, 1781)	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
92	<i>Tachyporus hypnorum</i> (FABRICIUS, 1775)	2	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
		1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
		2	06.08.2024	RE (2024)	cRC
93	<i>Tachinus subterraneus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC

Idf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
94	<i>Tachinus rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
95	<i>Tachinus marginellus</i> (FABRICIUS, 1781)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
96	<i>Cilea silphoides</i> (LINNAEUS, 1767)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
97	<i>Oligota pumilio</i> KIESENWETTER, 1858	8	26.03.2012	PE (2021)	cPC
98	<i>Gyrophæna affinis</i> MANNERHEIM, 1830	2	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		9	13.06.2024	RE (2024)	cRC
99	<i>Gyrophæna minima</i> ERICHSON, 1837 xyH	1	26.05.2024	RE (2024)	cRC
100	<i>Gyrophæna manca</i> ERICHSON, 1839 xyH	14	26.05.2024	RE (2024)	cRC
101	<i>Gyrophæna boleti</i> (LINNAEUS, 1758) xyH	12	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		21	13.06.2024	RE (2024)	cRC
		8	06.08.2024	RE (2024)	cRC
102	<i>Agaricochara latissima</i> (STEPHENS, 1832) xyH	3	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
103	<i>Anomognathus cuspidatus</i> (ERICHSON, 1839) xyF	3	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
104	<i>Leptusa pulchella</i> (MANNERHEIM, 1830) xyA	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
		1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
		1	26.05.2024	RE (2024)	cPC
		1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
		1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
		1	26.03.2012	PE (2021)	cRC
105	<i>Bolitochara obliqua</i> ERICHSON, 1837 xyH	3	26.03.2012	WF, gesiebt	cPC
		1	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
		5	21.07.2024	RE (2024)	cRC
106	<i>Bolitochara pulchra</i> (GRAVENHORST, 1806) xyH	1	26.05.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
107	<i>Bolitochara tecta</i> ASSING, 2014 xyH	1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
108	<i>Ischnopoda umbratica</i> (ERICHSON, 1837)	1	26.06.2002	TH, gesiebt	cPC
109	<i>Aloconota mihoki</i> (BERNHAEUER, 1913)	1	26.06.2002	TH, gesiebt	cPC
110	<i>Aloconota gregaria</i> (ERICHSON, 1839)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
111	<i>Amischa analis</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
112	<i>Amischa decipiens</i> (Sharp, 1869)	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
		1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
		3	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
113	<i>Nehemitropia lividipennis</i> (MANNERHEIM, 1830)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
114	<i>Geostiba circellaris</i> (GRAVENHORST, 1806)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
		1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
115	<i>Dinaraea aequata</i> (ERICHSON, 1837) xyA	1	26.06.2002	TH, gesiebt	cPC
		1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
116	<i>Dinaraea linearis</i> (GRAVENHORST, 1802) xyA	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
117	<i>Atheta hygrotopora</i> (KRAATZ, 1856)	3	26.06.2002	TH, gesiebt	cPC
118	<i>Atheta vaga</i> (HEER, 1839)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
119	<i>Atheta pittionii</i> SCHEERPELTZ, 1950	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
120	<i>Atheta pallidicornis</i> (THOMSON, 1856)	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
121	<i>Atheta fungi</i> (GRAVENHORST, 1806)	1 2 2 1 1	19.04.2006 16.03.2007 10.03.2009 06.09.2009 26.03.2012	LA, gesiebt TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt TH, BU, gesiebt PE (2021)	cPC cPC cPC cPC cPC
122	<i>Atheta crassicornis</i> (FABRICIUS, 1792)	3	11.06.2005	TH, BU, gesiebt	cPC
123	<i>Atheta longicornis</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
124	<i>Acrotona pygmaea</i> (GRAVENHORST, 1802)	1	26.03.2012	TH, BU, gesiebt	cPC
125	<i>Phloeopora testacea</i> (MANNERHEIM, 1830) xyF	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
126	<i>Phloeopora corticalis</i> (GRAVENHORST, 1802) xyF	2 1	10.03.2009 28.02.2010	TH, WK, Rinde gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
127	<i>Ocalea rivularis</i> MILLER, 1852	2	26.06.2002	TH, gesiebt	cPC
128	<i>Oxypoda longipes</i> MULSANT & REY, 1861	1	11.06.2005	WS, gesiebt	cPC
129	<i>Oxypoda brevicornis</i> (STEPHENS, 1832)	1	18.06.2005	WS, gesiebt	cPC
130	<i>Oxypoda alternans</i> (GRAVENHORST, 1802)	2 3	11.06.2005 26.05.2024	TH, Eiche, gesiebt RE (2024)	cPC cRC
131	<i>Oxypoda annularis</i> (MANNERHEIM, 1830)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
132	<i>Aleochara intricata</i> MANNERHEIM, 1830	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
133	<i>Bibloporus bicolor</i> (DENNY, 1825) xyA	3 3 1	19.04.2006 16.03.2007 26.03.2012	PE (2009) PE (2009) PE (2021)	cPC cPC cPC
134	<i>Bibloporus minutus</i> RAFFRAY, 1914 xyA	2	19.04.2006	PE (2009)	cPC
135	<i>Euplectus nanus</i> (REICHENBACH, 1816) xyA	2 2	19.04.2006 16.03.2007	PE (2009) PE (2009)	cPC cPC
*136	<i>Euplectus punctatus</i> MULSANT, 1861 xyA	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
137	<i>Euplectus karstenii</i> (REICHENBACH, 1816) xyA	3	16.03.2007	PE (2009)	cPC
138	<i>Tychus niger</i> (PAYKULL, 1800)	1	16.03.2007	PE (2009)	cPC
139	Cantharidae <i>Cantharis pellucida</i> FABRICIUS, 1792	1	19.05.2008	südexponierter Waldrand	cPC
140	<i>Cantharis flavilabris</i> FALLÈN, 1807	1	23.06.2010	südexponierter Waldrand	cPC
141	<i>Cantharis nigricans</i> (MÜLLER, 1776)	4 2	11.06.2005 19.05.2008	südexponierter Waldrand südexponierter Waldrand	cPC cPC
142	<i>Cantharis livida</i> LINNAEUS, 1758	4	11.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC
143	<i>Cantharis figurata</i> MANNERHEIM, 1843	1	11.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC
*144	<i>Ancistronycha tigurina</i> DIETRICH, 1857	1	26.06.2002	südexponierter Waldrand	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
145	<i>Malthinus flaveolus</i> (HERBST, 1786) xyA	1 1 2 4	26.06.2022 18.06.2005 03.07.2006 13.06.2024	südexponierter Waldrand südexponierter Waldrand südexponierter Waldrand RE (2024)	cPC cPC cPC cRC
146	Malachiidae <i>Charopus flavipes</i> (PAYKULL, 1798)	1	23.06.2010	südexponierter Waldrand	cPF
147	<i>Malachius bipustulatus</i> (LINNAEUS, 1758) xyA	2 1	26.05.2024 11.06.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
148	<i>Clanoptilus elegans</i> (OLIVIER, 1790)	1	26.05.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
149	<i>Cordylepherus viridis</i> (FABRICIUS, 1787)	1	23.06.2010	südexponierter Waldrand	cPC
150	<i>Axinotarsus marginalis</i> (LAPORTE DE CASTELNAU, 1840)	1	08.08.2004	südexponierter Waldrand	cPC
151	Dasytidae <i>Dasytes plumbeus</i> (MÜLLER, 1776) xyA	1 2	03.07.2006 13.06.2024	südexponierter Waldrand RE (2024)	cPC cRC
152	<i>Dasytes aeratus</i> STEPHENS, 1830 xyA	2	18.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC
*153	Cleridae <i>Tillus elongatus</i> (LINNAEUS, 1758) xyA, LÖR, IndxyKD	1	03.07.2006	TH, BU, daneben Holunder geklopft	cPC
154	Derodontidae <i>Laricobius erichsonii</i> ROSENHAUER, 1846	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
155	Elateridae <i>Dalopius marginatus</i> (LINNAEUS, 1758)	3	11.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC
156	<i>Agriotes pallidulus</i> (ILLIGER, 1807)	1	26.05.2024	RE (2024)	cRC
157	<i>Agriotes acuminatus</i> (STEPHENS, 1830)	1	18.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC
158	<i>Agriotes ustulatus</i> (SCHALLER, 1783)	2	11.06.2024	RE (2024)	cRC
159	<i>Agriotes obscurus</i> (LINNAEUS, 1758)	1 1	11.06.2005 19.05.2008	südexponierter Waldrand südexponierter Waldrand	cPC cPC
160	<i>Prosternon tessellatum</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.05.2008	südexponierter Waldrand	cPC
161	<i>Denticollis linearis</i> (LINNAEUS, 1758) xyA, LÖR, IndxyKD	1 1	11.06.2005 23.06.2010	südexponierter Waldrand südexponierter Waldrand	cPC cPC
162	<i>Limonius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
163	<i>Hemicrepidius niger</i> (LINNAEUS, 1758)	1	11.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
164	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (FABRICIUS, 1801)	2 1	11.06.2005 19.05.2008	südexponierter Waldrand südexponierter Waldrand	cPC cPC
165	<i>Athous subfuscus</i> (MÜLLER, 1764)	1	11.06.2005	südexponierter Waldrand	cPC
166	Eucnemidae <i>Melasis buprestoides</i> (LINNAEUS, 1761) xyF, LÖR	1	26.05.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
*167	<i>Dirrhagofarsus attenuatus</i> (MAEKLIN, 1845)	2	13.06.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
168	Throscidae <i>Trixagus dermestoides</i> (LINNAEUS, 1767)	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
169	<i>Trixagus carinifrons</i> (BONVOULOIR, 1859)	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
*170	<i>Trixagus leseigneuri</i> MUONA, 2002	1	13.06.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
171	<i>Trixagus elateroides</i> (HEER, 1841)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
172	<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (BONVOULOIR, 1859)	3	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
173	Buprestidae <i>Anthaxia quadripunctata</i> (LINNAEUS, 1758) xyF, LÖR	1	11.06.2024	RE (2024)	cRC
174	<i>Agrilus laticornis</i> (ILLIGER, 1803) xyF, LÖR	1	21.07.2024	RE (2024)	cRC
175	Scirtidae <i>Microcara testacea</i> (LINNAEUS, 1767)	1 2 1 2 1	11.06.2005 18.06.2005 19.05.2008 23.06.2010 13.06.2024	RE (2024)	cPC cPC cPC cPC cRC
176	<i>Contacyphon coarctatus</i> (PAYKULL, 1799)	2	11.06.2005		cPC
177	<i>Contacyphon ochraceus</i> (STEPHENS, 1830)	1	03.07.2006		cPC
178	<i>Contacyphon variabilis</i> (THUNBERG, 1787)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
179	<i>Contacyphon padi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
180	<i>Scirtes hemisphaericus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	23.06.2010	Teich, am Schilf	cPF
*181	<i>Scirtes orbicularis</i> (PANZER, 1793)	1	23.06.2010	Teich, am Schilf Neu für Chemnitz	cPF
182	Byturidae <i>Byturus tomentosus</i> (DEGEER, 1774)	3	11.06.2005	gekeschert	cPC
183	Cerylonidae <i>Cerylon histeroides</i> (FABRICIUS, 1792) xyA, LÖR	1 1	19.04.2006 16.03.2007	TH, BU, gesiebt TH, gesiebt	cPC cPC
184	<i>Cerylon ferrugineum</i> STEPHENS, 1830 xyA, LÖR	2 4 3 1	16.03.2007 29.05.2024 13.06.2024 21.07.2024	TH, gesiebt RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cPC cRC cRC cRC
185	<i>Cerylon deplanatum</i> GYLLENHAL, 1827 xyF, LÖR, RLD V	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
*186	Nitidulidae <i>Brassicogethes matronalis</i> (AUDISIO & SPORNRAFT, 1990)	2	03.07.2006	gekeschert Neu für Sachsen Neu für Chemnitz (PESCHEL 2010)	cKL ex cPC
187	<i>Brassicogethes coeruleovirens</i> (FÖRSTER, 1849)	1	03.07.2006	gekeschert	cPC
188	<i>Brassicogethes aeneus</i> (FABRICIUS, 1775)	2 1 1 2	19.04.2006 03.07.2006 10.03.2009 26.03.2012	LA, gesiebt CRW TH, WK, Rinde gesiebt PE (2021)	cPC cPC cPC cPC
189	<i>Epuraea biguttata</i> (THUNBERG, 1784) syn. <i>E. unicolor</i> (OLIVIER, 1790) xyS, RLD D	11	26.03.2012	PE (2021)	cPC
190	<i>Epuraea variegata</i> (HERBST, 1793) xyH	1	16.03.2007	TH, BU, gesiebt	cPC
191	<i>Epuraea aestiva</i> (LINNAEUS, 1758)	1 1	11.06.2005 18.06.2005	gekeschert gekeschert	cPC cPC
192	<i>Cychramus variegatus</i> (HERBST, 1792) xyH	2 1	26.05.2024 13.06.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
193	<i>Cychramus luteus</i> (FABRICIUS, 1787) xyH	1	23.06.2010	Waldrand, Linde, geklopft	cPF
194	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (LINNAEUS, 1758) xyF	1 4	10.03.2009 28.02.2010	TH, WK, Rinde gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
*195	Kateretidae <i>Heterhelus solani</i> (HEER, 1841)	1	23.06.2010	gekeschert Neu für Chemnitz	cPC
196	<i>Brachypterus urticae</i> (FABRICIUS, 1792)	1 1	11.06.2005 23.06.2010		cPC cPC
197	Monotomidae <i>Rhizophagus depressus</i> (FABRICIUS, 1792) xyF	2	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
198	<i>Rhizophagus dispar</i> (PAYKULL, 1800) xyF	3 2 2 7 4 1 7	19.04.2006 10.03.2009 28.02.2010 26.03.2012 26.05.2024 13.06.2024 26.03.2012	TH, BU, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt TH, BU, gesiebt RE (2024) RE (2024) PE (2021)	cPC cPC cPC cPC cPC cRC cRC
199	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (FABRICIUS, 1792) xyF	1 4 3 2	19.04.2006 26.03.2012 26.05.2024 26.03.2012	TH, BU, gesiebt TH, BU, gesiebt PE (2021)	cPC cPC cPC cRC
*200	Silvanidae <i>Silvanoprus fagi</i> (GUÉRIN MÉNEVILLE, 1844) xyA, LÖR	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
201	<i>Uleiota planatus</i> (Linnaeus, 1761) xyA, LÖR	3 7 3 4 6	26.03.2012 26.05.2024 13.06.2024 21.07.2024 06.08.2024	TH, Buche, gesiebt RE (2024) RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cPC cRC cRC cRC cRC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
*202	Biphyllidae <i>Diplocoelus fagi</i> (GUÉRIN MÉNEVILLE, 1844) xyH, LÖR	1	06.08.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
*203	Cryptophagidae <i>Telmatophilus typhae</i> (FALLÉN, 1802)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
204	<i>Cryptophagus labilis</i> ERICHSON, 1846 xyM, RLD V	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
*205	<i>Cryptophagus dentatus</i> (HERBST, 1793)	1 2 3	19.04.2006 10.03.2009 26.03.2012	TH, BU, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt PE (2021)	cPC cPC cPC
206	<i>Cryptophagus pallidus</i> STURM, 1845	1	06.09.2009	PE (2017)	cPC
*207	<i>Cryptophagus scutellatus</i> NEWMAN, 1834	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
208	<i>Cryptophagus punctipennis</i> BRISOUT DE BARNEVILLE, 1863 syn. <i>C. pilosus</i> GYLLENHAL, 1827	1 3	26.03.2012 26.05.2024	PE (2021) RE (2024)	cPC cRC
209	<i>Atomaria fuscata</i> (SCHÖNHERR, 1808)	1 2 2	19.04.2006 16.03.2007 10.03.2009	LA, gesiebt TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC cPC
210	<i>Atomaria atricapilla</i> STEPHENS, 1830	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
*211	<i>Atomaria puncticollis</i> THOMSON, 1868	2 1	16.03.2007 06.09.2009	TH, gesiebt TH, BU, gesiebt	cPC cPC
212	Phalacridae <i>Olibrus aeneus</i> (FABRICIUS, 1792)	1 1	16.03.2007 10.03.2009	TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
213	Laemophloeidae <i>Placonotus testaceus</i> (FABRICIUS, 1787) xyF	3	26.03.2012	TH, BU, gesiebt	cPC
*214	Latridiidae <i>Latridius porcatus</i> (HERBST, 1793)	5	26.03.2012	PE (2021)	cPC
215	<i>Latridius minutus</i> (LINNAEUS, 1767)	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
216	<i>Enicmus brevicornis</i> (MANNERHEIM, 1844) xyH	26	06.08.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
217	<i>Enicmus fungicola</i> THOMSON, 1868 xyH	1 1 1	19.04.2006 10.03.2009 26.03.2012	TH, BU, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt PE (2021)	cPC cPC cPC
218	<i>Enicmus rugosus</i> (HERBST, 1793)	1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
219	<i>Enicmus transversus</i> (OLIVIER, 1790) xy	2 1 1	19.04.2006 16.03.2007 26.03.2012	LA, gesiebt TH, gesiebt PE (2021)	cPC cPC cPC
220	<i>Enicmus histrio</i> JOY & TOMLIN, 1910	1	16.03.2007	TH, gesiebt	cPC
221	<i>Dienerella elongata</i> (CURTIS, 1830)	2 1 1 1 4 6 1	19.04.2006 16.03.2007 10.03.2009 26.05.2024 13.06.2024 21.07.2024 06.08.2024	TH, BU, gesiebt TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt RE (2024) RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cPC cPC cPC cRC cRC cRC cRC
222	<i>Stephostethus lardarius</i> (DEGEER, 1775)	1 1	16.03.2007 10.03.2009	TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
223	<i>Stephostethus angusticollis</i> (GYLLENHAL, 1827)	2 3	13.06.2024 21.07.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
*224	<i>Stephostethus alternans</i> (MANNERHEIM, 1844) xyH	3	26.05.2024	RE (2024)	cRC
225	<i>Corticarina similata</i> (GYLLENHAL, 1827)	2 1	19.04.2006 26.05.2024	LA, gesiebt RE (2024)	cPC cRC
226	<i>Corticinara gibbosa</i> (HERBST, 1793)	1 6 4 2 1 3 5 9 8 18	11.06.2005 19.04.2006 19.04.2006 16.03.2007 10.03.2009 26.03.2012 26.05.2024 13.06.2024 21.07.2024 06.08.2024	südexponierter Waldrand TH, BU, gesiebt LA, gesiebt TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt PE (2021) RE (2024) RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cPC cPC cPC cPC cPC cPC cRC cRC cRC cRC
*227	<i>Melanophthalma rispini</i> RÜCKER & JOHNSON, 2007	1	13.06.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
228	Mycetophagidae <i>Litargus connexus</i> (GEOFFROY, 1785) xyH, LÖR	2	06.08.2024	RE (2024)	cRC
229	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (LINNAEUS, 1760) xyH, LÖR	1	26.03.2012	WF, gesiebt	cPC
230	<i>Mycetophagus piceus</i> FABRICIUS, 1792 xyH, LÖR, RLD V	1	21.07.2024	RE (2024)	cRC
231	<i>Mycetophagus atomarius</i> FABRICIUS, 1787 xyH, LÖR	4 1 1	19.04.2006 26.05.2024 13.06.2024	TH, BU, gesiebt RE (2024) RE (2024)	cPC cRC cRC
232	<i>Mycetophagus quadriguttatus</i> MÜLLER, 1821 xyH, LÖR	2	26.03.2012	PE (2021)	cPC
233	Zopheridae <i>Synchita humeralis</i> (FABRICIUS, 1792) xyA, LÖR	7	26.05.2024	RE (2024)	cRC
234	<i>Bitoma crenata</i> (FABRICIUS, 1775) xyA, LÖR	2 1	26.03.2012 26.03.2012	TH, BU, gesiebt PE (2021)	cPC cPC
*235	Corylophidae <i>Arthrolips obscura</i> (SAHLBERG, 1833) xyH, RLD D	2	06.08.2024	RE RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
236	<i>Orthoperus atomus</i> (GYLLENHAL, 1808) xyH	5	13.06.2024	RE (2024)	cRC
237	<i>Mycetina cruciata</i> (SCHALLER, 1783) xyH, LÖR, IndxyKD	2	13.06.2024	RE (2024)	cRC
238	Endomychidae <i>Endomychus coccineus</i> (LINNAEUS, 1758) xyH, LÖR	2	26.03.2012	TH, BU, gesiebt	cPC
239	Coccinellidae <i>Scymnus suturalis</i> THUNBERG, 1795	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
240	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	18.06.2005	gekeschert	cPC
241	<i>Aphidecta oblitterata</i> (LINNAEUS, 1758)	5	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
242	<i>Adalia decempunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	1	03.07.2006	gekeschert	cPC
243	<i>Harmonia quadripunctata</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
244	<i>Calvia decemguttata</i> (LINNAEUS, 1767)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
		1	18.06.2005	gekeschert	cPC
		1	23.06.2010	gekeschert	cPC
		1	26.03.2012	PE (2021)	cPC
245	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (LINNAEUS, 1758)	1	26.06.2002	gekeschert	cPC
		1	11.06.2005	gekeschert	cPC
		1	18.06.2005	gekeschert	cPC
		1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
246	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
247	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (LINNAEUS, 1758)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
248	Ciidae <i>Octotemnus glabriculus</i> (GYLLENHAL, 1827) xyH, LÖR	2	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
		1	25.03.2012	TH, BU, gesiebt	cPC
		2	13.06.2024	RE (2024)	cRC
		1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
249	<i>Ropalodontus perforatus</i> (GYLLENHAL, 1813) xyH, LÖR	3	26.05.2024	RE (2024)	cRC
250	<i>Sulcacis nitidus</i> (FABRICIUS, 1792) xyH, LÖR	1	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
		4	06.08.2024	RE (2024)	cRC
251	<i>Cis castaneus</i> (HERBST, 1793) xyH, LÖR	11	19.04.2006	TH, gesiebt	cPC
		9	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		9	06.08.2024	RE (2024)	cRC
252	<i>Cis micans</i> (FABRICIUS, 1792) xyH, LÖR	1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
253	<i>Cis boleti</i> (SCOPOLI, 1763) xyH, LÖR	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
		1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
		9	06.09.2009	TH, BU, gesiebt	cPC
		2	13.06.2024	RE (2024)	cRC
		1	21.07.2024	RE (2024)	cRC
		5	06.08.2024	RE (2024)	cRC
254	<i>Cis fagi</i> WALTZ, 1839 xyH, LÖR, RLD D	1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
255	<i>Cis festivus</i> (PANZER, 1793) xyH, LÖR	3	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
256	<i>Orthocis alni</i> (GYLLENHAL, 1813) xyH, LÖR	4	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		1	21.07.2024	RE (2024)	cRC
257	<i>Ennearthron cornutum</i> (GYLLENHAL, 1827) xyH, LÖR	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
		1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
258	Ptinidae <i>Hyperisus plumbeus</i> (ILLIGER, 1801) xyA, LÖR	1	11.06.2005	TH, BU, gesiebt	cPC
259	<i>Hemicoelus fulvicornis</i> (STURM, 1837) xyA, LÖR	2	26.05.2024	RE (2024)	cRC
		1	13.06.2024	RE (2024)	cRC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
260	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (LINNAEUS, 1758) xyA, LÖR	2	03.07.2006 26.05.2024 21.07.2024	TH, BU, gesiebt RE (2024) RE (2024)	cPC cRC cRC
261	<i>Dorcatoma dresdensis</i> HERBST, 1792 xyH, LÖR	5	26.05.2024	RE (2024)	cRC
262	<i>Dorcatoma robusta</i> STRAND, 1938 xyH, LÖR, IndxyKD, RLD 3	1	03.07.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
263	Oedemeridae <i>Oedemera femorata</i> (SCOPOLI, 1763)	3 1	26.05.2024 21.07.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
264	<i>Oedemera virescens</i> (LINNAEUS, 1767)	1 1	11.06.2005 26.05.2024	gekeschert RE (2024)	cPC cRC
265	<i>Oedemera lurida</i> (MARSHAM, 1802)	1 2	11.06.2005 26.05.2024	gekeschert RE (2024)	cPC cRC
*266	Pythidae <i>Pytho depressus</i> (LINNAEUS, 1767) xyF, LÖR, IndxyKD	7 17 6 13	16.03.2007 10.03.2009 28.02.2010 28.02.2012	TH, WK, Rinde gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC cPC cPC
267	Salpingidae <i>Lissodema denticolle</i> (GYLLENHAL, 1813) xyF, LÖR	1 1 1	26.05.2024 13.06.2024 21.07.2024	RE (2024) RE (2024) RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC cRC cRC
268	<i>Vincenzellus ruficollis</i> (PANZER, 1794) xyF, LÖR	12 1	26.05.2024 21.07.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
269	<i>Salpingus planirostris</i> (FABRICIUS, 1787) xyF, LÖR	3 28 9 14 2	18.06.2005 29.05.2024 13.06.2024 21.07.2024 06.08.2024	TH, gesiebt RE (2024) RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cPC cRC cRC cRC cRC
270	<i>Salpingus ruficollis</i> (LINNAEUS, 1761) xyF, LÖR	1 1	13.06.2024 06.08.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
271	Pyrochroidae <i>Pyrochroa coccinea</i> (LINNAEUS, 1761) xyA	6 2 1	26.05.2024 21.07.2024 06.08.2024	RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cRC cRC cRC
272	<i>Schizotus pectinicornis</i> (LINNAEUS, 1758) xyA	1	19.05.2008	südexponierter Waldrand	cPC
273	Scraptiidae <i>Anaspis frontalis</i> (LINNAEUS, 1758) xyA	1 3	11.06.2005 13.06.2024	gekeschert RE (2024)	cPC cRC
274	<i>Anaspis thoracica</i> (LINNAEUS, 1758) xyA	2	13.06.2024	RE (2024)	cRC
*275	<i>Anaspis ruficollis</i> (FABRICIUS, 1792) xyA	1 1	11.06.2005 03.07.2006	gekeschert gekeschert	cPC cPC
276	<i>Anaspis rufilabris</i> (GYLLENHAL, 1827) xyA	1	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
*277	Aderidae <i>Anidorus nigrinus</i> (GERMAR, 1842) xyA, LÖR	1	23.06.2010	gekeschert	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
278	Mordellidae <i>Tomoxia bucephala</i> COSTA, 1854 xyA	1	23.06.2010	gekeschert	cPF
279	<i>Mordella holomelaena</i> APFELBECK, 1914 xyA	1	13.06.2024	RE (2024)	cRC
280	Melandryidae <i>Orchesia undulata</i> KRAATZ, 1853 xyH, LÖR	1 1 2 1	16.03.2007 10.03.2009 21.07.2024 06.08.2024	TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt RE (2024) RE (2024)	cPC cPC cRC cRC
281	<i>Phloiotrya rufipes</i> (GYLLENHAL, 1810) xyA, LÖR, IndxyKD, RLD V	2	26.05.2024	RE (2024)	cRC
282	<i>Conopalpus testaceus</i> (OLIVIER, 1790) xyA, LÖR	1	03.07.2006	TH, Eiche, gesiebt	cPC
283	Tetratomidae <i>Tetratoma fungorum</i> FABRICIUS, 1790 xyH, LÖR	1	19.04.2006	TH, BU, gesiebt	cPC
*284	<i>Hallomenus binotatus</i> (QUENSEL, 1790) xyH, LÖR	3	13.06.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
285	Tenebrionidae <i>Bolitophagus reticulatus</i> (LINNAEUS, 1767) xyH, LÖR, RLD 3	12 4 7	13.06.2024 21.07.2024 06.08.2024	RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cRC cRC cRC
286	<i>Corticeus unicolor</i> PILLER & MITTERBACHER, 1783 xyA, LÖR	1 4 2 2	19.04.2006 26.03.2012 26.05.2024 06.08.2024	LA, gesiebt TH, BU, gesiebt RE (2024) RE (2024)	cPC cPC cRC cRC
287	<i>Uloma culinaris</i> (LINNAEUS, 1758) xyA, LÖR, IndxyKD, RLD 2	1	26.05.2024	RE (2024)	cRC
*288	Scarabaeidae <i>Onthophagus joannae</i> GOLJAN, 1953		2010	Pferdekot	cPC
289	<i>Onthophagus coenobita</i> (HERBST, 1783)		2010	Pferdekot	cPC
290	<i>Aphodius fimetarius</i> (LINNAEUS, 1758)	2	08.08.2004	Pferdekot	cPC
291	<i>Trichius gallicus</i> DEJEAN, 1821 xyA, LÖR	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
292	Lucanidae <i>Sinodendron cylindricum</i> (LINNAEUS, 1758) xyA, LÖR	1 3 1 1	26.05.2024 13.06.2024 21.07.2024 06.08.2024	RE (2024) RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cRC cRC cRC cRC
293	Cerambycidae <i>Rhagium mordax</i> (DEGEER, 1775) xyF, LÖR	1	21.07.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
294	<i>Rhagium inquisitor</i> (LINNAEUS, 1758) xyF, LÖR	1	21.07.2024	RE (2024)	cRC
295	<i>Grammoptera ruficornis</i> (FABRICIUS, 1781) xyA, LÖR	1	18.06.2005	geklopft	cPC
296	<i>Pseudovadonia livida</i> (FABRICIUS, 1777)	2	26.05.2024	RE (2024)	cRC
297	<i>Leiopus nebulosus</i> (LINNAEUS, 1758) xyF, LÖR	1	18.06.2005	TH, Äste, geklopft	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
298	<i>Leiopus taeniatus</i> (GMELIN 1790) syn. <i>Leiopus linnei</i> WALLIN, NYLANDER & KVAMME, 2009; xy	1	21.07.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
299	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (DEGEER, 1775)	1	10.06.2005	gekeschert	cPC
300	<i>Stenostola dubia</i> (LAICHARTING, 1784) xyF, LÖR	1	11.06.2005	TH, geklopft	cPC
301	<i>Tetrops praeustus</i> (LINNAEUS, 1758) xyF, LÖR	2	13.06.2024	RE (2024)	cRC
*302	Chrysomelidae <i>Plateumaris consimilis</i> (SCHRANK, 1781)	2	28.05.1945	ex. coll. ZABEL ⁽¹⁾	cPF
		2	06.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
303	<i>Lema cyanella</i> (LINNAEUS, 1758) RLD 3	1	29.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		2	08.07.1946	ex. coll. ZABEL	cPF
304	<i>Oulema obscura</i> (STEPHENS, 1831)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
		1	03.07.2006	gekeschert	cPC
305	<i>Oulema melanopus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	28.02.2010	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
306	<i>Chrysolina fastuosa</i> (SCOPOLI, 1763)	1	03.07.2006	Waldrand, gekeschert	cPC
307	<i>Chrysolina oricalcia</i> (MÜLLER, 1776)	2	08.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
308	<i>Gastrophysa viridula</i> (DEGEER, 1775)	1	01.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	11.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	13.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	15.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
309	<i>Phaedon cochleariae</i> (FABRICIUS, 1792)	3	11.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
310	<i>Prasocuris marginella</i> (LINNAEUS, 1758)	1	16.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	11.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	13.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		2	19.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
311	<i>Plagiodera versicolora</i> (LAICHARTING, 1781)	3	13.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
312	<i>Chrysomela tremula</i> FABRICIUS, 1787	1	27.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
313	<i>Plagiosterna aenea</i> (LINNAEUS, 1758)	1	24.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
314	<i>Gonioctena decemnotata</i> (MARSHAM, 1802)	1	01.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	11.06.2024	RE (2024)	cRC
315	<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (FABRICIUS, 1787)	4	13.06.2024	RE (2024)	cRC
316	<i>Galerucella lineola</i> (FABRICIUS, 1781)	1	04.06.1941	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	16.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	30.07.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	11.06.2005	gekeschert	cPC
317	<i>Agelastica alni</i> (LINNAEUS, 1758)	1	02.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		1	26.06.2002	geklopft	cPC
318	<i>Phyllotreta vittula</i> (REDTENBACHER, 1849)	2	10.03.2009	TH, WK, Rinde gesiebt	cPC
319	<i>Phyllotreta undulata</i> KUTSCHERA, 1860	1	18.06.2005	gekeschert	cPC
320	<i>Cassida viridis</i> LINNAEUS, 1758	1	30.06.1946	ex. coll. ZABEL	cPF
321	<i>Cassida flaveola</i> THUNBERG, 1794	2	02.06.1945	ex. coll. ZABEL	cPF
		2	07.07.1945	ex. coll. ZABEL / 1Ex. cPC	cPF
322	<i>Cassida vibex</i> LINNAEUS, 1767	1	19.05.2008	gekeschert	cPC
323	<i>Cassida rubiginosa</i> MÜLLER, 1776	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
		3	19.05.2008	gekeschert	cPC
324	<i>Cassida stigmatica</i> SUFFRIAN, 1844	1	19.05.2008	gekeschert	cPC
325	<i>Cassida denticollis</i> SUFFRIAN, 1844	2	27.06.2008	gekeschert	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
*326	<i>Bruchus loti</i> PAYKULL, 1800	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
327	<i>Bruchus rufimanus</i> BOHEMAN, 1833	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
*328	<i>Bruchidius varius</i> (OLIVIER, 1795)	2	11.06.2005	gekeschert	cPC
	Attelabidae				
329	<i>Temnocerus coeruleus</i> (FABRICIUS, 1798)	1	11.06.2024	RE (2024)	cRC
330	<i>Byctiscus populi</i> (LINNAEUS, 1758)	1	26.05.2024	RE (2024)	cRC
331	<i>Deporaus betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	1	26.06.2002	gekeschert	cPC
	Brentidae				
332	<i>Ceratapion onopordi</i> (KIRBY, 1808)	1	19.05.2008	gekeschert	cPC
333	<i>Protapion fulvipes</i> (GEOFFROY, 1785)	4 1 1 1 1	11.06.2005 19.04.2006 19.04.2006 16.03.2007 10.03.2009	gekeschert LA, gesiebt TH, gesiebt TH, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC cPC cPC cPC
334	<i>Protapion trifolii</i> (LINNAEUS, 1768)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
335	<i>Protapion assimile</i> Kirby, 1808	2	19.05.2008	gekeschert	cPC
336	<i>Catapion seniculus</i> (KIRBY, 1808)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
*337	<i>Catapion meieri</i> (DESBROCHERS DES LOGES, 1901)	1	18.06.2005	gekeschert	cPC
338	<i>Betulapion simile</i> (KIRBY, 1811)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
338	<i>Stenopterapion meliloti</i> (KIRBY, 1808)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
340	<i>Eutrichapion viciae</i> (PAYKULL, 1800)	1	23.06.2010	gekeschert	cPC
	Curculionidae				
341	<i>Scolytus ratzeburgi</i> JANSON, 1856 xyF	4 1 1	26.05.2024 21.07.2024 06.08.2024	RE (2024) RE (2024) RE (2024)	cRC cRC cRC
342	<i>Hylurgops palliatus</i> (GYLLENHAL, 1813) xyF	1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
343	<i>Polygraphus poligraphus</i> (LINNAEUS, 1758) xyF	3	13.06.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
344	<i>Hylesinus crenatus</i> (FABRICIUS, 1787) xyF	1	13.06.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
345	<i>Hylesinus varius</i> (FABRICIUS, 1775) xyF	18 7	13.06.2024 21.07.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
*346	<i>Crypturgus cinereus</i> (HERBST, 1794) xyF	12 1	16.03.2007 10.03.2009	TH, Buche, gesiebt TH, WK, Rinde gesiebt	cPC cPC
347	<i>Pityophthorus pubescens</i> (MARSHAM, 1802) xyF	1	26.05.2024	RE (2024) Neu für Chemnitz	cRC
348	<i>Taphrorychus bicolor</i> (HERBST, 1793) xyF	1	06.08.2024	RE (2024)	cRC
349	<i>Pityogenes chalcographus</i> (LINNAEUS, 1760) xyF	5 7 6	10.03.2009 13.06.2024 21.07.2024	TH, WK, Rinde gesiebt RE (2024) RE (2024)	cPC cRC cRC
350	<i>Ips typographus</i> (LINNAEUS, 1758) xyF	3 1	13.06.2024 21.07.2024	RE (2024) RE (2024)	cRC cRC
351	<i>Xylosandrus germanus</i> (BLANDFORD, 1894) xyF	2	06.08.2024	RE (2024)	cRC
352	<i>Phyllobius pomaceus</i> GYLLENHAL, 1834	1	19.05.2008	Waldrand, gekeschert	cPC
353	<i>Polydrusus impar</i> GOZIS, 1882	1	03.07.2006	gekeschert	cPC
354	<i>Polydrusus tereticollis</i> (DEGEER, 1775)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC

ldf. Nr.	Taxon ökologische Gilden bei xylobionten Käferarten	n	Datum	Sonstiges & Literaturhinweise	leg. coll.
355	<i>Strophosoma melanogrammum</i> (FORSTER, 1771)	1	18.06.2005	gekeschert	cPC
356	<i>Sitona cylindricollis</i> (FAHRAEUS, 1840)	2	11.06.2005	gekeschert	cPC
357	<i>Stereocorynes truncorum</i> (GERMAR, 1824) xyA, LÖR	8	21.07.2024	RE (2024)	cRC
358	<i>Tychius picirostris</i> (FABRICIUS, 1787)	1	11.06.2005	gesiebt	cPC
359	<i>Trachodes hispidus</i> (LINNAEUS, 1758) xyA, LÖR	4	26.05.2024	RE (2024)	cRC
360	<i>Hypera rumicis</i> (LINNAEUS, 1758)	2	11.06.2005	gekeschert	cPC
361	<i>Hypera meles</i> (FABRICIUS, 1792)	2	11.06.2005	gekeschert	cPC
362	<i>Hypera postica</i> (GYLLENHAL, 1813)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
363	<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (MARSHAM, 1802)	1	19.04.2006	LA, gesiebt	cPC
364	<i>Ceutorhynchus typhae</i> (HERBST, 1795)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
365	<i>Parethelcus pollinarius</i> (FORSTER, 1771)	1	19.05.2008	gekeschert	cPC
366	<i>Hadroplontus litura</i> (FABRICIUS, 1775)	1	19.05.2008	gekeschert	cPC
367	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC
		1	03.07.2006	gekeschert	cPC
368	<i>Rhinusa tetra</i> (FABRICIUS, 1792)	1	18.06.2005	gekeschert	cPC
369	<i>Stereonychus fraxini</i> (DEGEER, 1775)	4	18.06.2005	gekeschert	cPC
370	<i>Notaris acridulus</i> (LINNAEUS, 1758)	2	11.06.2005	gekeschert	cPC
371	<i>Grypus equiseti</i> (FABRICIUS, 1775)	1	11.06.2005	gekeschert	cPC

(1) Die Arten in der Collection WERNER PETZOLD (Flöha) (ex. coll. ZABEL) stammen aus der ehemaligen Entomologischen Handlung STAUDINGER & BANG-HAAS, Dresden (vor 1945). Das Material wurde von der Firma KOCH (Dresden) übernommen und von Herrn K. H. SANDNER (Markneukirchen) Ende der 1950er Jahre erworben. Herr W. PETZOLD (Flöha) hat einen Teil dieser Sammlung (ca. 11.000 Ex.) zwischen den Jahren 2007 bis 2012 von Herrn K. H. SANDNER (Markneukirchen) gekauft.

Faunistisch bemerkenswerte Arten

Histeridae

Abraeus granulum ERICHSON, 1839

PESCHEL & PETZOLD (2024) verweisen auf WITZGALL (1971), wonach die Art in Mitteleuropa nicht häufig bis sehr selten sein soll. Die Intensität und Methodik der Aufsammlungen und Auslese sowohl die geringe Größe der Arten können hier die Ursache hierfür sein. Die Arten des Genus sind vor Ort sehr leicht zu übersehen und sind erst bei näherer Inaugenscheinnahme unter dem Binokular zu unterscheiden. Es empfiehlt sich bei Auffinden größerer Mengen mehrere Belege mitzunehmen. Im DKat (2025) liegen in Sachsen aus allen Regionen aktuelle Meldungen vor. In der Oberlausitz ist die Art von mehr als 15 Fundorten bekannt (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). Erstmeldung der Art für Chemnitz durch GOLLKOWSKI (2008). Infolgedessen dass viel an und im Totholz gesiebt wurde, gelangen zahlreiche Funde (PESCHEL 2018): REIKE (2018 [Chemnitzer Zeisigwald]), HAHN et al. (2022) [Leipziger Auwald], (PESCHEL 2022, 2024) [Dahlener Heide].

Leiodidae

Amphicyllis globiformis (SAHLBERG, 1833)

Ein erster Hinweis zum aktuellen Vorkommen in Sachsen findet sich bei FISCHER et al. (2006). Nach HORNIG & KLAUSNITZER (2022) eine in Sachsen verbreitete Art. In der Oberlausitz aus allen Regionen gemeldet

(KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). Die Verbreitungskarte in DKat (2025) widerspiegelt jedoch derzeit einen geringen Kenntnisstand zur Verbreitung der Art in Sachsen.

Staphylinidae

Euplectus punctatus MULSANT, 1861

Von LORENZ (2001) erstmals für Sachsen gemeldet. Bisher nur aus wenigen Regionen Sachsens bekannt (Oberlausitz, Dresden, Chemnitz) (DKat 2025). Fundangaben finden sich bei FISCHER et al. (2006), HORNIG & KLAUSNITZER (2022), KLAUSNITZER et al. 2018, PESCHEL (2009, 2013, 2023), VOGEL (2010, 2013), WEIGEL (2005, 2008).

Cantharidae

Ancistronycha tigurina DIETRICH, 1857

Bei HORNIG & KLAUSNITZER (2022) nur wenig Literatur zu dieser Art. Obwohl einige Funde in Sachsen bekannt sind, wird die Art verschiedentlich unter anderem Namen geführt. Bei GÜNTHER & PESCHEL (2001) und FISCHER et al. (2006) ist die Art auf Grundlage von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) als *Ancistronycha cyanipennis* (FALDERMANN, 1835) gemeldet. Bereits in KLAUSNITZER et al. (2009) vermerkt unter dem nunmehr lautenden Namen *A. violacea* (PAYKULL, 1798) (= *cyanipennis* auct., nec. BACH, 1854). Bei KLAUSNITZER et al. (2018: 316) ist der Vermerk zu finden, dass *Ancistronycha violacea* (PAYKULL, 1798) jetzt laut SILFVERBERG (DKat 2025) *A. tigurina* DITTRICH, 1857 ist. Siehe ebenfalls KLAUSNITZER et al. (2018: 479) lfd. Art Nr. 2147. Der Schwerpunkt derzeitiger Funde liegt in Ostsachsen (Großraum Dresden, Oberlausitz) (DKat 2025; KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). Für Chemnitz bereits von GÜNTHER & PESCHEL (2001) gemeldet. Nach 2000 erneut an zwei Fundorten im Stadtgebiet nachgewiesen. Neben dem Fund im Crimmitschauer Wald im Jahr 2002 wurde die Art noch in Chemnitz-Harthau (1 Ex. 31.05.2003 leg., det. et. coll. GÜNTHER) gefunden.

Cleridae

Tillus elongatus (LINNAEUS, 1758)

In Sachsen weit verbreitet (DKat 2025). In Chemnitz derzeit nur von zwei Fundorten bekannt (Zeisigwald [REIKE 2018, PESCHEL 2024], Crimmitschauer Wald [PESCHEL 2017]).

Eucnemidae

Dirrhagofarsus attenuatus (MAEKLIN, 1845)

Erstfund für Deutschland in Darmstadt (Hessen) im Jahr 2009 (BRENNER 2011, KÖHLER 2011). BRENNER (2016) meldet einen erneuten Fund im Jahr 2014. Auf Grundlage der Angaben im DKat von 2015 informiert bereits HORNIG et al. (2016) im Vorab über den Erstfund für Sachsen bei WEIGEL im Jahr 2014. WEIGEL (2020) zitiert nochmals den bereits bei HORNIG et al. (2016) im Vorab dokumentierten Neufund in Sachsen. Nach HORION (1953) ist die Art eine große Seltenheit. Bei HORNIG & KLAUSNITZER (2022) sind nur zwei Literaturhinweise vermerkt. Den dritten Fund für Sachsen melden REIKE & PÖLITZ (2023) (1 Ex. bei Strehla 09.06.2022). Mit dem Nachweis im Crimmitschauer Wald von Chemnitz am 13.06.2024 (REIKE 2024) ist dies der vierte Fund in Sachsen. **Neu für Chemnitz.**

Throscidae

Trixagus leseigneuri MUONA, 2002

In Deutschland weit verbreitet. Die Schwerpunkte der Funde in Sachsen liegen derzeit in den Regionen Oberlausitz und Dresden (HORNIG & KLAUSNITZER 2022; JÄGER & LORENZ 2020; SOBCZYK & HOFFMANN 2021). Im Weiteren aus Nordsachsen und der Umgebung von Penig gemeldet (DKat 2025). Der Fund im Crimmitschauer Wald (13.06.2024 leg. REIKE) ist neu für die Region Chemnitz-Erzgebirge. **Neu für Chemnitz.**

Scirtidae

Scirtes orbicularis (PANZER, 1793)

Im DKat (2025) in Sachsen bislang nur Fundraster in den Regionen Dresden und Oberlausitz (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). In HORNIG & KLAUSNITZER (2022) kaum sächsische Literatur zu dieser Art vorliegend. PESCHEL & PETZOLD (2024) gelang der Nachweis der Art in Nordsachsen (Dahlener Heide). **Neu für Chemnitz.**

Nitidulidae

Brassicogethes matronalis (AUDISIO & SPORNRAFT, 1990)

Die Art wurde von PESCHEL (2010) als Neu für Sachsen gemeldet (2 Ex. 03.07.2006 Chemnitz, Crimmitschauer Wald, leg. PESCHEL, i. coll. KONZELMANN [Ludwigsburg]), 1 Ex Marienberg [Erzgebirge] 09.05.2008, leg. i. coll. PESCHEL, alle Belege det. KONZELMANN). Zahlreiche Funde der Jahre 2012 und 2014 in der Oberlausitz sind bei KLAUSNITZER et al. 2018 aufgeführt. Im DKat (2025) derzeit nur ein Fundraster in der Oberlausitz aus der Umgebung von Hoyerswerda. **Neu für Chemnitz.**

Kateretidae

Heterhelus solani (HEER, 1841)

Derzeit wenige Funde in Sachsen (Oberlausitz 1970, 1971, 1976, 2010 und 2016) (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018) bekannt. Wurde von GOLLKOWSKI (2008) auch im Vogtland gefunden. Einen Nachweis für die Region Chemnitz/Erzgebirge dokumentierte PESCHEL (2018) (Burg Scharfenstein). Im Weiteren wurde die Art auch auf dem Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel gefunden (1 Ex. Moorbirkenwald, gesiebt, 28.06.2019, leg., det. et coll. PESCHEL). **Neu für Chemnitz.**

Silvanidae

Silvanoprus fagi (GUÉRIN MÉNEVILLE, 1844)

Nach derzeitigem Kenntnisstand (DKat 2025) liegen die Schwerpunkte der Funde in Ostsachsen (Region Oberlausitz und Dresden incl. Elbsandsteingebirge). In den Regionen Chemnitz/Erzgebirge, Vogtland und Leipzig bislang wenige Nachweise.

REIKE (2018) erwähnt erstmals die Art für Chemnitz aus dem Zeisgwald. Weitere Funde folgten im Jahr 2024 im Crimmitschauer Wald (REIKE 2024) und im Zeisigwald (PESCHEL 2024).

Biphyllidae

Diplocoelus fagi (CHEVROLAT, 1837)

Den Erstnachweis für die Fauna von Chemnitz erbrachte REIKE (2024) im Crimmitschauer Wald. Der

Verbreitungskarte in DKat (2025) nach konzentriert sich derzeit der Schwerpunkt der Funde auf die Region Dresden (DKat 2025). Weitere Nachweise im Erzgebirge (DIETRICH 2010), in der Oberlausitz (8 Fundorte) (KLAUSNITZER et al. 2018), im Vogtland und der Region Leipzig (DKat 2025), dort auch aus der Dahleener Heide gemeldet (PESCHEL & PETZOLD 2024). **Neu für Chemnitz.**

Cryptophagidae

Telmatophilus typhae (FALLÉN, 1802)

Nach HORNIG & KLAUSNITZER (2022) eine in Sachsen verbreitete Art. Folgt man der Verbreitungskarte im DKat (2025), so konzentrieren sich demnach die Funde auf Ostsachsen (Regionen Oberlausitz, Dresden und Chemnitz/Erzgebirge (Umgebung Lunzenau und Frohburg). Ergänzend können folgende Funde für Sachsen genannt werden. FISCHER et al. (2006) nennen einen Fund aus der Schwarzwasseraue in Schwarzenberg (am Schloßwald, am Krähenhübel). Aus Nordsachsen (Dahleener Heide) von PESCHEL & PETZOLD (2024) gemeldet. Seit 2002 ist die Art in Chemnitz (Borna, Ebersdorf, Euba, Zeisigwald, Crimmitschauer Wald) mehrfach (24 Exemplare) gefunden worden (2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 (alle Belege leg. et coll. PESCHEL, det. SIEBER & ESSER). Im Weiteren wurde die Art im Jahr 2007 in drei Belegen bei Reitzenhain (Erzgebirge) gefunden (leg. PESCHEL, det. ESSER).

Cryptophagus dentatus (HERBST, 1793)

Nach der im DKat (2025) vorliegenden Verbreitungskarte konzentrieren sich die Funde der Art auf Ostsachsen. Neben den hier in der Artenliste genannten Funden im Crimmitschauer Wald von Chemnitz können weitere sächsische Funde hinzugefügt werden. FISCHER et al. (2006) meldete die Art vom FND „Erlenbruch am Kreuzborn“ bei Crimmitschau (Sahnwald), HAHN et al. (2022) aus dem Leipziger Auwald, PESCHEL (2021) aus dem Chemnitzer Zeisigwald, PESCHEL (2022a) aus dem Rabenauer Grund bei Freital und PESCHEL (2023) von Wechselburg.

Cryptophagus scutellatus NEWMAN, 1834

Obwohl die Art nach LOHSE (1967) wohl überall häufig sein soll, HORNIG & KLAUSNITZER (2022) ihr Vorkommen in Sachsen als verbreitet angeben, dokumentieren nur vier Fundraster (DKat 2025) (Region Dresden incl. Elbsandsteingebirge und der Region Leipzig) das gegenwärtige Verbreitungsbild. *C. scutellatus* ist aus allen Regionen der Oberlausitz (KLAUSNITZER et al. 2018) gemeldet. Neben bereits veröffentlichten Funden aus der Stadt Chemnitz (Crimmitschauer Wald und dem Schösserholz [PESCHEL 2021]) wurde die Art ebenfalls im Chemnitzer Zeisigwald gefunden (1 Ex. 22.03.2012, Buche gesiebt leg. et coll. PESCHEL, det. ESSER).

Atomaria puncticollis THOMSON, 1868

Nach LOHSE (1967) ist die Art vermutlich weit verbreitet. HORNIG & KLAUSNITZER (2022) bezeichnen das Vorkommen in Sachsen als verbreitet. Dem gegenüber stehen derzeit 6 Fundraster in der Verbreitungskarte (DKat 2025) (5 Region Dresden/Osterzgebirge und 1 Oberlausitz). In der Oberlausitz ist die Art bisher von 11 Fundorten (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018) nachgewiesen. HAHN et al. (2022) melden die Art aus dem Leipziger Auwald. Neben den beiden Funden im Crimmitschauer Wald liegt ein weiterer Nachweis aus Chemnitz-Adelsberg vor (1 Ex. 09.07.2006 leg. et coll. PESCHEL, det. ESSER).

Latrididae

Latridius porcatus (HERBST, 1793)

Nach HORNIG & KLAUSNITZER (2022) eine in Sachsen verbreitete Art. In der Oberlausitz aus allen Regionen gemeldet (KLAUSNITZER et al. 2018). Neben den Nachweisen in Chemnitz wurde die Art auch im Erzgebirge bei Steinbach (PESCHEL 2021) gefunden. Die Verbreitungskarte dieser Art (DKat 2025) weist für Sachsen aber nur ein Fundraster aus, welches bei alleiniger Betrachtung zu falschen Rückschlüssen hinsichtlich Vorkommen und Verbreitung in Sachsen führen kann.

Stephostethus alternans (MANNERHEIM, 1844)

Eine im Allgemeinen seltene Art (PEEZ 1967). Von zwei Fundorten als Neu für die Oberlausitz gemeldet (KLAUSNITZER et al. 2018). Weitere Funde in den Regionen Dresden/Osterggebirge; Leipzig und Vogtland (DKat 2025). REIKE (2018) erwähnt diese Art erstmals für Chemnitz (Zeisigwald). Wurde jetzt auch im Crimmitschauer Wald gefunden (REIKE 2024). Zweiter Fundplatz in Chemnitz.

Melanophthalma rispini RÜCKER & JOHNSON, 2007

Die Art wurde von HORNIG et al. (2016) als Neu für Sachsen gemeldet, als Neu für die Oberlausitz in KLAUSNITZER et al. (2018). Eine weitere Fundmeldung aus der Oberlausitz folgt von JÄGER & LORENZ (2022).

Im DKat (2025) bislang nur Fundraster in den Regionen Oberlausitz und Dresden/Osterggebirge. Von REIKE (2024) in einem Exemplar aus dem Crimmitschauer Wald für die Region Chemnitz/Erzgebirge belegt.

Neu für Chemnitz.

Corylophidae

Arthrolips obscura (SAHLBERG, 1833)

Nach FREUDE (1971) sporadisch und selten. Bisher nur vereinzelte Funde in Sachsen (Regionen Oberlausitz, Dresden/Osterggebirge, Chemnitz/Erzgebirge, Leipzig [DKat 2025]). Ergänzend für die Region Leipzig sei noch die Fundmeldung von PESCHEL & PETZOLD (2024) für die Dahleener Heide (Frauwalde) genannt. Von REIKE (2024) im Crimmitschauer Wald gefunden. **Neu für Chemnitz.**

Pythidae

Pytho depressus (LINNAEUS, 1767)

PESCHEL (2019) machte bereits darauf aufmerksam, dass zu *P. depressus* nur selten publiziert worden ist und die bisherigen Funde sicher nicht die tatsächliche Bestandssituation repräsentieren. Die Schwerpunkte der Funde befinden sich in Ostsachsen (Regionen Oberlausitz und Dresden/Osterggebirge [DKat 2025]). Ungewöhnlich war die Fundhäufigkeit im Crimmitschauer Wald in einem Bestand von *Pinus strobus* (Weymouthskiefer) in den Jahren 2007, 2009, 2010 und 2012. Insgesamt wurden 43 Exemplare auf einer reativ kleinen Fläche an absterbenden und toten Weymouthskiefern nachgewiesen (PESCHEL 2019). Auch wenn im Zeisigwald ein Bestand an Weymouthskiefern vorhanden ist, wurde die Art in diesem Waldgebiet ausschließlich unter Rinde von *Pinus sylvestris* (Gemeine Kiefer) gefunden.

Scaptiidae

Anaspis ruficollis (FABRICIUS, 1792)

In Mitteleuropa sehr zerstreut verbreitet und sehr selten (ERMISCH, 1969). In Sachsen mehrfach in der Oberlausitz nachgewiesen (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). In der Verbreitungskarte (DKat 2025) sind die Schwerpunkte der Funde in den Regionen Oberlausitz und Dresden/Osterzgebirge, einzelne Nachweise in der Region Leipzig und Vogtland. Weitere Funde für die Region Leipzig dokumentieren HAHN (2022) (Leipziger Auwald) und PESCHEL & PETZOLD (2024) (Dahlener Heide: Neußen, Zeuckritz). Erstmals am 12.07.2003 in Chemnitz-Siegmarsburg gefunden (leg. et coll. PESCHEL, det. SIEBER). Der Crimmitschauer Wald ist der zweite Fundort im Stadtgebiet.

Aderidae

Anidorus nigrinus (GERMAR, 1842)

Nach KASZAB (1969) in Deutschland die häufigste Art der Gattung. Bemerkenswert die Schwerpunkte bisheriger Funde, welche in Ostsachsen (Region Oberlausitz und Dresden/Osterzgebirge) liegen. Auch im Vogtland aktuelle Funde vorhanden (DKat 2025). Die Regionen Leipzig, Chemnitz/Erzgebirge sind nicht präsent. Bereits seit GÜNTHER & PESCHEL (2001) ist die Art für Chemnitz gemeldet. Hierbei handelt es sich um einen Fund vom 27.06.1986 im Chemnitzer Zeisigwald (PESCHEL 1989). Der Fund im Crimmitschauer Wald ist der erste Nachweis nach dem Jahr 2000. Für die Region Leipzig sind Funde aus der Dahlener Heide (Frauwalde, Ochsenaal) bei PESCHEL & PETZOLD (2024) dokumentiert.

Tetratomidae

Hallomenus binotatus (QUENSEL, 1790)

Den Angaben von KASZAB (1969) zufolge stellenweise und selten. Nach HORNIG UND KLAUSNITZER (2022) in Sachsen verbreitet. In der Oberlausitz von mindestens 10 Fundorten gemeldet (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). Die Funde konzentrieren sich vorrangig auf Ostsachsen (Region Oberlausitz und Dresden/Osterzgebirge). Derzeit wenige Nachweise in der Region Leipzig und Chemnitz/Erzgebirge (DKat 2025). Für die Region Chemnitz/Erzgebirge (Wechselburg) ist die Art dokumentiert (ZERCHE 1976, PESCHEL 2023). Wurde von REIKE (2024) in Chemnitz im Crimmitschauer Wald gefunden. **Neu für Chemnitz.**

Scarabaeidae

Onthophagus joannae GOLJAN, 1953

Das Verbreitungsbild im DKat (2025) weist erhebliche Kenntnislücken für Sachsen auf. Bei alleiniger Betrachtung dieser Karte ergäbe sich ein völlig falsches Bild des tatsächlichen Kenntnisstandes. Hierzu sei auf die Arbeit von RÖßNER (2012) aufmerksam gemacht, worin für Sachsen eine Vielzahl an Fundorten aufgelistet ist. Der Schwerpunkt der Funde zeichnet sich in Ostsachsen (Region Oberlausitz und Dresden/Osterzgebirge) ab. War in Chemnitz bisher nur von einem Fundort bekannt (Chemnitz-Furth/aus Taubenmist [PESCHEL 2023a]). Der Crimmitschauer Wald ist der zweite Fundort in Chemnitz.

Chrysomelidae

Bruchus loti PAYKULL, 1800

Nach HORNIG & KLAUSNITZER (2022) eine in Sachsen verbreitete Art. Bisher Funde in den Regionen Oberlausitz (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018), Dresden/Osterzgebirge und Chemnitz/Erzgebirge (Chemnitz, Umgebung Flöha) (DKat 2025). Seit 2002 in der Stadt Chemnitz von mehreren Fundorten (Altchemnitz, Zeisigwald, Chemnitz-Siegmars, Chemnitz-Kappel, Crimmitschauer Wald) bekannt.

Bruchidius varius (OLIVIER, 1795)

KLAUSNITZER et al. (2009) melden die Art als Neu für Sachsen. Nach der Verbreitungskarte in DKat (2025) bislang aus den Regionen Leipzig, Dresden/Osterzgebirge und Chemnitz/Erzgebirge (Stadt Chemnitz [PESCHEL 2017]) bekannt. Bei KLAUSNITZER et al (2009, 2018) von mehreren Fundorten im Tief- und Hügelland der Oberlausitz gemeldet. Der Crimmitschauer Wald ist der zweite Fundort in Chemnitz.

Brentidae

Catapion meieri (DESBROCHERS DES LOGES, 1901)

Derzeit wenige aktuelle Funde in Sachsen (Region Leipzig, Chemnitz/Erzgebirge und Oberlausitz) (DKat 2025). In der Oberlausitz von mindestens neun Fundorten gemeldet (KLAUSNITZER et al. 2009, 2018). Die erste Erwähnung zu einem Fund in Chemnitz findet sich bei PESCHEL (2008). Die Art ist mehrfach in Chemnitz nachgewiesen worden (Chemnitz-Siegmars, Zeisigwald [2002], Chemnitz-Furth [2004], Chemnitz-Siegmars, Crimmitschauer Wald [2005], Chemnitz-Einsiedel [2009], alle Belege leg. et coll. PESCHEL, det. SPRICK).

Curculionidae


Crypturgus cinereus (HERBST, 1794)

Obwohl eine verbreitete und häufige Art, konzentrieren sich die Funde auf Ostsachsen (Region Oberlausitz und Dresden/Osterzgebirge). Einzelne Fundraster in der Region Vogtland und Leipzig (DKat 2025). Die Art wird erstmals von REIKE (2018) für die Fauna der Stadt Chemnitz (Zeisigwald) (Region Chemnitz/Erzgebirge) erwähnt. Der Crimmitschauer Wald ist der zweite Fundort in Chemnitz.

Zusammenfassung

Im Zeitraum von 2002 bis 2024 sind im Crimmitschauer Wald 371 Käferarten erfasst worden, darunter 134 xylobionte Arten. Im Weiteren gelangen 20 Neufunde für die Käferfauna von Chemnitz.

Für fünf Arten ist der Crimmitschauer Wald der zweite Fundplatz im Stadtgebiet. Es werden 29 bemerkenswerte Arten hervorgehoben.



Literatur

- BRENNER, U. (2011): Käferfunde des Jahres 2009 aus Hessen. 18. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. – Hessische faunistische Briefe 30: 27-46.
- BRENNER, U. (2016): Käferfunde des Jahres 2014 aus Hessen. 23. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. – Hessische faunistische Briefe 35: 17-40.
- DIETRICH, W. (2010): Beobachtung einiger Pilzkäferarten (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54 (1): 67-69.
- DKat (2025) [BLEICH, O., GÜRLICH, S. & KÖHLER, F. und weitere Autoren, auf Grundlage von KÖHLER, F. und KLAUSNITZER, B. (1998)]: Verzeichnis der Käfer Deutschlands Online. – www.colkat.de
- ERMISCH, K. (1969): Heteromera, 79. Fam. Mordellidae, In: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.). – Die Käfer Mitteleuropas, Band 8. – GOECKE & EVERS, Krefeld, 388 S.
- FISCHER, U., BURGER, F., WEIGEL, A. & BREINL, K. (2006): Beiträge zur Insekten- und Spinnenfauna des Erzgebirges und des sächsischen Vogtlandes (Aculeata, Coleoptera, Araneae/ Opiliones) in: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Bd.5. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Supplement 5: 1-152.
- FREUDE, H. (1971): Staphylinoidae, 19. Familie Orthoperidae, In: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.). – Die Käfer Mitteleuropas, Band 3. – GOECKE & EVERS, Krefeld, 365 S.
- GOLKOWSKI, V. (2008): Interessante Käferfunde aus Sachsen (1972 bis 2007) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 52 (2): 143.
- GÜNTHER, I. & PESCHEL, R. (2001): in: Pflanzen – Tiere – Lebensräume in Chemnitz, Ein Arten- und Biotopschutzkonzept, 4.14 sonstige Käfer (Coleoptera – excl. Carabidae). – Natur-Hof Chemnitz e.V., 203-210, 381-395.
- HAHN, L., BRUNK, I., HAACK N. L., PREUSS, L. & BERNHARD, D. (2022): Die Diversität der Coleoptera im Leipziger Auwald - erste Ergebnisse einer mehrjährigen Untersuchung mit Flugfensterfallen im Kronenraum und in der Strauchschicht. – Entomologische Nachrichten und Berichte 66 (1): 69- 89.
- HORION, A. (1953): Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Bd. III, Malacodermata, Sternoxia (Elatерidae - Throscidae). – Eigenverlag Museum Frey, München 1953.
- HORNIG, U., HOFFMANN, W., JÄGER, O., KLAUSNITZER, B., KWAST, T., LORENZ, J. & SIEBER, M. (2016): Ein neuer Zwischenstand bei der Bearbeitung der Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 60 (1): 19-27.

- HORNIG, U. & KLAUSNITZER, B. (2022): Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Sachsens mit einer Darstellung der historischen Grundlagen. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 26, 299 Seiten. Dresden.
<https://rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbellose-Tiere-1875.html>
- JÄGER, O. & LORENZ, J. (2020): 10. Treffen ostsächsischer Coleopterologen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 39 (134): 76-92.
- JÄGER, O. & LORENZ, J. (2022): *Neomida haemorrhoidalis* (FABRICIUS, 1787) in Sachsen (Coleoptera, Tenebrionidae), vom Urwaldrelikt zur weit verbreiteten Allerweltsart? – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 41 (144): 159-163.
- KASZAB, Z. (1969): Heteromera, 74. Fam. Aderidae, 80. Fam. Serropalpidae, In: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.). – Die Käfer Mitteleuropas, Band 8. - GOECKE & EVERS, Krefeld, 388 S.
- KLAUSNITZER, B., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., HORNIG, U., JÄGER, O., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2009): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 12: 252 S., 1 Karte. Dresden.
- KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., JÄGER, O., MÜLLER, H., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2018): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 3: Nachträge, Gesamtübersicht und Analyse der Umweltbezüge. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 23, 632 S, 305 Abb., 1 Karte. Dresden.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) (Coleoptera) Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 109–174.
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 4, 1-185.
- LOHSE, G. A. (1967): Clavicornia 55. Familie Cryptophagidae, In: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.). – Die Käfer Mitteleuropas, Band 7. - GOECKE & EVERS, Krefeld, 310 S.
- LORENZ, J. (2001): Die Holz- und Pilzkäferfauna in Dresden (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte 45 (3/4): 205-220.
- LORENZ, J. (2010): „Urwaldrelikt“-Käferarten in Sachsen (Coleoptera). – Sächsische Entomologische Zeitschrift 5: 69-98.
- PESCHEL, R. (1989): Zur Coleopterenfauna des Zeisigwaldes in Karl-Marx-Stadt. – Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt 19: 16-19.
- PESCHEL, R. (2008): Zur Kenntnis der Käferfauna der Stadt Chemnitz in Sachsen – Ein Wasserbassin als Käferfalle (Coleoptera). – Sächsische Entomologische Zeitschrift 3: 112-119.
- PESCHEL, R. (2009): Ein kleiner Beitrag zur Fauna der Palpenkäfer von Sachsen (Coleoptera: Pselaphidae). – Mitteilungen für sächsische Insektenfreunde 1: 17-23.
- PESCHEL, R. (2010): Weitere bemerkenswerte Käferfunde aus Sachsen - *Meligethes matronalis* AUDISIO & SPORNRAFT, 1990 und *Epuraea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 (Coleoptera, Nitidulidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 54 (2): 142.
- PESCHEL, R. (2017): Bemerkenswerte Käferfunde (Insecta, Coleoptera) aus Chemnitz, dem Erzgebirge und anderen sächsischen Regionen (2002-2013). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 36 (119): 8-18.
- PESCHEL, R. (2018): Erneute Mitteilung bemerkenswerter Käferfunde (Coleoptera) aus Chemnitz, dem Erzgebirge und anderen sächsischen Regionen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen, 37, 126: 159-170.
- PESCHEL, R. (2019): Beobachtungen von *Pytho depressus* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera, Pythidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 63 (1): 31-32.
- PESCHEL, R. (2021): Käferfunde an Wildfutterstellen in Chemnitz und im Erzgebirge [COL]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 40 (137): 2-16.
- PESCHEL, R. (2022): Neu- und Wiederfunde sowie weitere bemerkenswerte Käfernachweise (Coleoptera) in Sachsen und Brandenburg. – Entomologische Nachrichten und Berichte 66 (1): 99-101.
- PESCHEL, R. (2022a): Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der in den Jahren 2016 und 2018 im Rabenauer Grund bei Freital (Sachsen) erfassten Käfer (Coleoptera). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 41 (146): 328-334.
- PESCHEL, R. (2023): Zur Kenntnis der bislang im Schlosspark von Wechselburg/Sachsen und seiner Umgebung aufgefundenen Käfer (Coleoptera). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 43 (148): 61-82.
- PESCHEL, R. (2023a): Ergebnisse von Käferaufsammlungen (Coleoptera) am Köder „Taubenmist“ in Chemnitz (Sachsen). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 42 (147): 18-20.

- PESCHEL, R. (2024): Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera) an einem sonnenexponierten Holzlagerplatz am Chemnitzer Zeisigwald (Sachsen). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 43 (150): 42-46.
- PESCHEL, R. & PETZOLD, W. (2024): Ein Beitrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Dahleiner Heide in Nordsachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 43 (150): 84-177.
- PEEZ, V. A. (1967) Clavicornia 58. Familie Lathridiidae, In: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.). – Die Käfer Mitteleuropas, Band 7. - GOECKE & EVERS, Krefeld, 310 S.
- REIKE, H.-P. (2018): Übersichtskartierung von Totholzkäfern im FND „Buchenbestand am Goldborn" – Endbericht 2017/2018, unveröffentlichtes Gutachten. Chemnitz.
- REIKE, H.-P. (2024): Übersichtskartierung von Totholzkäfern auf der NWE-Fläche im Crimmitschauer Wald Chemnitz, Endbericht 2024, unveröffentlichtes Gutachten. Chemnitz.
- REIKE, H.-P. & PÖLITZ, B. (2023): Interessante Käfernachweise aus Sachsen (Coleoptera, Eucnemidae, Curculionidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 67 (1): 78-79.
- RÖßNER, E. (2012): Die Hirschkäfer und Blatthornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). – Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., Erfurt, 508 S.
- SCHMIDL, J. & BÜRLER, H. (2004): Ökologische Gilden xylobionter Käfer Deutschlands. Einsatz in der landschaftsökologischen Praxis-ein Bearbeitungsstand. – Naturschutz und Landschaftsplanung 36 (7): 202-218.
- SIEBER, M. (1985): Ein Beitrag zur Zwergkäferfauna der Oberlausitz (Coleoptera, Pselaphidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 29 (2): 221-223.
- SOBCZYK, TH. & HOFFMANN, W. (2021): Beifänge aus Pheromonfallen zur Überwachung von Kiefernborckenkäfern in der Oberlausitz (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 65 (1): 51-60.
- VOGEL, J. (2010): Neue bemerkenswerte und revidierte Staphylinidae (Coleoptera) aus Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte 54 (3/4): 213-246.
- VOGEL, J. (2013): Die Staphyliniden-Fauna der Oberlausitz. Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 2.- In: Klausnitzer, B. & Reinhardt, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Band 15. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 15: 252 S., 1 Karte. Dresden.
- WEIGEL, A. (2005): Neu- und Wiederfunde sowie weitere bemerkenswerte Nachweise von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte 49 (3-4): 161-170.
- WEIGEL, A. (2008): Beitrag zur Käferfauna, insbesondere der Holzkäferfauna, zweier Referenzbereiche Bereiche im Zeisigwald Chemnitz (Sachsen). – Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Staatlichen Umweltamtes Chemnitz. 16 S.
- WEIGEL, A. (2020): Der Schienenkäfer *Dirrhagofarsus attenuatus* (MÄKLIN, 1845) neu für Sachsen (Coleoptera, Eucnemidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 64 (1): 9-10.
- WITZGALL, K. (1971) Histeroidea, 10. Familie Histeridae. In: FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (Hrsg.). – Die Käfer Mitteleuropas, Band 3. - GOECKE & EVERS, Krefeld, 365 S.
- ZERCHE, L. (1976): Wechselburg - ein neuer Fundort seltener Käferarten im Bezirk Karl-Marx-Stadt. – Entomologische Nachrichten (Dresden) 20 (4/5): 53-80.

Anschriften

Rüdiger Peschel, Bersarinstraße 48, 09130 Chemnitz, plegaderus@gmail.com

Werner Petzold, Am Pfarrwald 59, 09557 Flöha, w.p.fl@gmx.de

Zitiervorschlag:

- PESCHEL, R. & PETZOLD, W. (2025): Zur Kenntnis der in den Jahren 2002 bis 2024 im Crimmitschauer Wald (Chemnitz/Sachsen) gefundenen Käferarten (Coleoptera) nebst Vermerk zu Neufunden für die Käferfauna von Chemnitz. – MSE-Online 2025-25 (28 Seiten); 01.12.2025.